NAVU FORTE

Îngrășământ EC

Fertilizant foliar complex obținut prin nanotehnologie, recomandat pentru tratamente foliare în culturile agricole

Formulare: pulbere umectabila

Descrierea produsului: Navu Forte conține următoarele macro și microelemente:

COMPONENTE :	(%M/M)
Azot (N) total	8,0
Azot (N) sub formă de amidă	8,0
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă	10,0
Calciului total bazat pe CaO	21,0
Calciului solubil în apă bazat pe CaO	3,0
Oxid de magneziu (MgO) total	3,0
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	0,2
Trioxid de sulf (So3) solubil în apă	10,00
Cupru (Cu) solubil în apă	0,10
Fier (Fe) solubil în apă	0,10
Mangan (Mn) solubil în apă	0,10
Molibden (Mo) solubil în apă	0,05

Mod de acțiune:

Fertilizantul foliar Navu Forte este destinat utilizării în toate culturile agricole de câmp, legume de câmp, spații protejate, livezi și plante ornamentale. Datorită formulării prin nanotehnologie aprovizionează repede plantele cu macronutrienți și micronutrienți stimulând intensitatea fotosintezei și creșterea activității clorofilei din frunze. Mărește rezistența plantelor la stres climatic, hidric, îngheț și reduce sensibilitatea plantelor la atacul patogenilor, crește randamentul de producție și calitatea fructelor .

Mod de utilizare: Fertilizantul foliar Navu Forte se aplică foliar în soluție apoasă. Doza pentru o singură aplicare este de 4-5 kg/ha, în funcție de cultură.

Volum de apă: 200-400 l apă/ha

Produsul este recomandat a se utiliza la următoarele culturi și doze :

CULTURA	DOZA	APLICĂRI	MOMENTUL APLICĂRII:
Cereale (de toamnă și primăvară)	4 kg/ha	2	-prima stropire de la faza de înfrățire până la faza celui de al doilea internod -a doua stropire de la faza frunzei stindard și până la înflorire
Sfeclă de zahăr	4 kg/ha	2-3	-prima stropire aplicată la 3-5 frunze -următoarele stropiri după 14-21 zile
Porumb	4 kg/ha	1	-în faza de 3-6 frunze
Rapiță de toamnă	4 kg/ha	2	-prima stropire toamna în faza de 3-5 frunze -a doua stropire primăvara după începerea vegetației
Rapiță de primăvară	4 kg/ha	2	-prima stropire în faza de 3-5 frunze -a doua stropire de la faza apariției tulpinii până la căderea petalelor
Sfeclă	4 kg/ha	2-3	-prima stropire în faza de 3-5 frunze -următoarele stropiri după 14-21 zile
Cartofi	4 kg/ha	2-3	-prima stropire după apariția completă (10-15 cm înălțimea plantei) -următoarele stropiri după 14-21 zile
Legume bulboase (ceapă)	4 kg/ha	2-3	-prima stropire în faza de 3-4 frunze -următoarele stropiri după 14-21 zile
Roșii	4 kg/ha	2-3	-prima stropire la 7 zile după plantarea răsadului (concentratie prima stropire 1%), -a doua stropire după 14 zile de la plantarea răsadului -a treia stropire după primul etaj de flori
Ardei	4 kg/ha	2-3	-prima stropire la 7 zile după plantarea răsadului -a două stropire înainte de înflorire -a treia stropire la începutul formării legumelor
Castraveți	4 kg/ha	2-3	-prima stropire în faza de 6 frunze -următoarele stropiri la fiecare 14 zile

CULTURA	DOZA	APLICĂRI	MOMENTUL APLICĂRII:
Varza timpurie	4 kg/ha	2	-prima stropire la 3-4 zile după plantarea răsadului (concentrația pentru prima stropire 1%,) -a doua stropire după 14 zile de la plantare
Varza de toamnă	4 kg/ha	3-4	-prima stropire la 3-4 zile după plantarea răsadului (concentrația la prima stropire 1%,) -a doua stropire după 14 zile de la plantare -următoarele stropiri la fiecare 21 zile
Plante ornamentale	4 kg/ha	1-3	-stropirile în perioada creșterii intense
Fasole	4 kg/ha	2-3	- prima stropire în faza de 3-4 frunze - următoarele stropiri la fiecare 14 zile
Țelină	4 kg/ha	3-4	-prima stropire la 3-4 zile după plantarea răsadului (concentrația la prima stropire 1%,) -a doua stropire după 14 zile de la plantare -următoarele stropiri la fiecare 21 zile
Ridiche	4 kg/ha	1	-stropirea în fază de 3 frunze
Morcov, Pătrunjel, păstârnac	4 kg/ha	2	-prima stropire în faza 4-6 frunze -a doua stropire după 14-21 zile
Spanac	4 kg/ha	1	-stropirea în faza a 3-5 frunze
Porumb Zaharat	4 kg/ha	1	-stropirea în faza a 3-6 frunze
Căpșuni	4-5 kg/ha	2	-prima stropire înainte de înflorire -a doua stropire după 7 zile de la legarea fructelor
Zmeură	4-5 kg/ha	2	-prima stropire înainte de înflorire -a doua stropire după 7 zile de la legarea fructelor
Coacăze , agrișe	4-5 kg/ha	2	-prima stropire înainte de înflorire -a doua stropire după 7 zile de la legarea fructelor
Struguri	4-5 kg/ha	2-3	-prima stropire după apariția frunzelor -a doua stropire înainte de înflorire -a treia după formarea strugurilor
Măr	4-5 kg/ha	3-4	-prima stropire în faza buton verde -a doua stropire după 14 zile de la înflorire -următoarele stropiri până la culegerea fructelor (nu mai târziu de 14 zile înainte de recoltare)
Păr	4-5 kg/ha	3-4	-prima stropire în faza buton verde -a doua stropire după 14 zile de la înflorire -următoarele stropiri până la culegerea fructelor (nu mai târziu de 14 zile înainte de recoltare)

CULTURA	DOZA	APLICĂRI	MOMENTUL APLICĂRII:
Vișine, cireșe	4-5 kg/ha	2-3	-prima stropire în faza buton alb -următoarele stropiri în perioada creșterii fructelor până la recoltare (nu mai târziu de 14 zile înainte de recoltare)
Prune	4-5 kg/ha	2-3	-prima stropire în faza buton alb -următoarele stropiri în perioada creșterii fructelor până la recoltare (nu mai târziu de 14 zile înainte de recoltare)
Arbuști ornamentali	4 kg/ha	1-3	- Se aplică în perioada creșterii intense

Compatibilitate: În cazul utilizării în amestec cu pesticide îngrășământul trebuie turnat primul. După 10 minute de amestecare continuă a lichidului de pulverizare, amestecul se poate aplica în câmp. Îngrășământul foliar nu este compatibil cu produsele puternic acide. Tratamentele trebuie să fie efectuate dimineața sau seara târziu. Nu efectuați pulverizarea în timpul perioadelor de insolație sau arsiță. Nu utilizați îngrășământul pentru plantele care preferă pH scăzut al solului.

Recomandări: Se recomandă utilizarea aplicărilor suplimentare la culturile intensive, în scopul de a mări rezistența culturilor la condițiile de stres.

Se recomandă adaosul de adjuvant nonionic ASYSTENT +.