

KELPAK

Biostimulator pentru plante, din alge marine proaspete

COMPOZIȚIE *ECKLONIA MAXIMA*

Crește randamentul tuturor culturilor.

Sporește fructificarea în culturile pomicole.

Compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor.

Mențineți pH-ul soluției de tratament sub 7!

Agitați bine conținutul recipientului înainte de utilizare.

CULTURA	DOZA(L/ha) CONCENTRAȚIE(%)	MOD DE APLICARE
CEAPA USTUROI	1:100 dilutie 2 L/ha	Se scufundă bulbii cu aprox. 5 minute înainte de plantare Fertilizare la 14 zile de la plantare. Se repeat fertilizarea de 2 ori la intervale de 14 zile, sau Aplicare la stadiul de 3 - 4-frunze cu repetare de 2 ori la interval de 14 zile.
CARTOF	2 -4 L/ha 2L/ha	După rasarire, la începutul formării coroanei(12-15 cm diametru) și la începutul formării tubercurilor. Vara, după perioade secetoase urmate de precipitații, se aplică pentru a reduce formarea de tuberculi noi (tuberculi secundari).
TOMATE, VINETE, ARDEI,	1:100 dilutie	Tăvile pentru răsaduri sunt ținute cu partea inferioară în soluție Kelpak® sau răsadurile sunt stropite înainte de transplantare,
	2 L/ha	Se repetă 1-2 ori la interval de 14 zile,
	2 L/ha	Prima aplicare la stadiul de 4 frunze. Se repeată 1-2 ori la interval de 14 zile,
SALATĂ, VARZĂ, CONOPIDĂ,	1:100 diluție (la transplantare)	Tăvile pentru răsaduri sunt ținute cu partea inferioară în soluție Kelpak® sau răsadurile sunt stropite înainte de transplantare, cu aspersorul, sau aplicare la 14 zile după transplantare cu repatare 1-2 ori la 14-21 zile.
	2-3 L/ha(foliar)	La stadiul de 3-5 frunze cu repetare 1-2 ori la 14-21 zile.
CASTRAVEȚI, DOVLECEI, DOVLECI, PEPENI	1:100 dilutie 3 L/ha	Tăvile pentru răsaduri sunt ținute cu partea inferioară în soluție Kelpak® sau răsadurile sunt stropite înainte de transplantare, cu aspersorul. sau Două-trei tratamente foliare la intervale de 14 zile după transplantare.
CEREALE	2 L/ha	Tratament foliar primăvara, împreună cu erbicidarea
RAPIȚA	2 L/ha	Tratament foliar aplicat toamna sau primăvara. Toamna în stadiul de 4-6 frunze. Primăvara-odată cu primul tratament cu produse de protecție a plantelor.

FLOAREA SOARELUI	2 L/ha	Tratament foliar la stadiul de 4-6 frunze . Se repeată la interval de 14-21 zile.
PORUMB	2 L/ha	Tratament foliar la stadiul de 3-5 frunze.
NAP	2 L/ha 2L/ha	Tratament foliar în toamnă, când cultura are încă acoperire foliară suficientă. Primăvara la începutul vegetației.
CĂPȘUN	1:100 diluție 3 L/ha	Se scufundă stolonii înainte de plantare. Toamna: Aplicare la 21 zile după plantare. Se repetă 21 zile . Primăvara: Aplicații foliare de la începutul creșterii vegetative la intervale de 21 de zile.
AFINE, ZMEUR, COACAZ	3 l/ha	Se aplica 3 tratamente: la stadiile de buton roz, înflorire completă, formarea fructelor.
MĂR	3 L/ha	În timpul formării fructelor (fructe cu diametrul de aproximativ 10 mm). Se repeată fertilizarea de 2 ori la intervale de 14 zile. Pentru o mai bună colorare a fructelor se aplica produsul la stadiul de schimbare a culorii acestora.
CIREȘ	3 L/ha	Se aplica de la buton alb până la înflorire totală, apoi după căderea petalelor. Se aplica la culoarea galben-pai a fructelor, cu repetare, la interval de 7-10 zile între aplicări.
CAIS, PIERȘIC, PRUN, NECTARIN	3 l/ha	Se aplica la formarea fructelor. Repetări de două ori la intervale de 14 zile.
VIȚĂ DE VIE- struguri pentru masă	2 - 3 L/ha 3-4 L/ha	Pentru creșterea lastarilor: de la 2-5 cm lungimea lastarilor. Repetare la 10-14 zile. Aplicare la formarea fructelor (4-5 mm diametru) Se repeat de 3-4 ori la interval de 10-14 zile.
VIȚĂ DE VIE- struguri pentru vin	2 L/ha 2-3 L/ha	Pentru creșterea lăsatrilor: aplicare la 5-frunze. Aplicare la 14 înainte de înflorire, la înflorire și la formarea primelor fructe.
MORCOV, ȚELINĂ	2 L/ha	Două-trei tratamente foliare la intervale de 14 zile începând cu stadiul de 4-5 frunze.
SOIA, FASOLE	2 L/ha	Primul tratament foliar la stadiul de 3-5 frunze trifoliolate Al doilea tratament la un interval de 14-21 de zile
SFECLĂ DE ZAHĂR	2-3 L/ha	Tratament foliar la stadiul de 4-8 frunze.
TUTUN	1:100 diluție	Se introduc tăvile cu răsaduri în soluția Kelpak® cu câteva zile înainte de transplantare sau se udă răsadurile la plantare.
PLANTAȚII TINERE(PEPINIERE) DE POMI FRUCTIFERI SAU VIȚĂ DE VIE	1:100 dilutie sau 1:200 dilutie sau 1:500 dilutie 1:300 dilutie	Se scufunda radaciile timp de 5 min înainte de transplantare sau Se scufunda saculeții cu puieți înainte de transplantare sau se uda solul în jurul puieților. Aplicare prin sistemul de irigare după transplantare Aplicare 3 - 5 ori pe durata creșterii, la intervale de 21 zile.
GAZON- terenuri sportive	2 L/ha	La începutul sezonului de creștere cu repetare la 4 zile Se repeat fertilizarea după o vară cu condiții de stress.
GAZON-Terenuri de golf(întreținere)	1:200 diluție 1:400 diluție	Se aplică 20 L soluție la 100 m ² . Se aplică lunar 20 L soluție la 100 m ² .

LUCERNĂ	2 L/ha	La începutul răsării și apoi la 3-5 zile după fiecare tundere.
POMI FRUCTIFERI, NUCI, VITA DE VIE	IRIGARE :10-15 L/ha	Irigare , la prima “spalare “a radacinilor.

PFC 6 (B) BIOSTIMULATOR VEGETAL NEMICROBIAN

INGREDIENTE Extract lichid de alge marine *Ecklonia maxima*

Produs derivat în sensul Regulamentului (UE) 2019/1009 (PFC 6, CMC2)

Produs potrivit pentru utilizarea în agricultura ecologică conform anexelor hotărârilor (EU) Nr. 2018/848 și nr 2021/1165 și a reglementărilor NOP și CC emise de KIWA BCS în concordanță cu hotărârea (EU) nr. 2021/1165 și NOP 7CFR, capitolul 205 pentru utilizarea ca fertilizator în culturile ecologice.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se păstra în recipientul original, sigilat, etichetat, într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

A se evita temperaturile sub 0°C sau peste 40°C

A se păstra separat de produsele alimentare și furajere.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau accesul animalelor.

NOTĂ

Acest produs nu conține conservanți și este ambalat în condiții sterile.

Pentru a evita eventuale contaminări ale produsului care pot cauza blocarea duzelor de pulverizare, se recomandă să utilizați conținutul ambalajului imediat după deschidere sau cât mai curând posibil după deschidere,

Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare și de utilizare al produsului și de aceea își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

PRODUCĂTOR

Fabricat de:

Kelp Products (Pty) Ltd

Nr. înregistrare Registrul

Comerțului 1972/001287/07

2 Link Road

Capricorn Business Park

Cape Town,

South Africa, 7945

Importator/Distribuitor:

Innvigo Agro SRL

Cluj-Napoca, Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nr 8-10,

Jud Cluj, Tel: 0374.912.123;
Email: office.ro@innvigo.com
www.ro.innvigo.com

Data expirării: 3 ani de la data fabricației

Data producției/numărul lotului: pe ambalaj

Forma de condiționare: suspensie