

SIRA PLUS

Îngrășământ lichid care conține sulf și rășini de origine naturală.

- îmbunătățește starea de sănătate și rezistența plantelor în condiții de stress
- are un efect pozitiv asupra dezvoltării plantelor, cu efect pozitiv asupra calității și cantității recoltei
- produsul ofera o mai bună aderență pe frunze



Informații privind siguranța utilizatorului și a mediului:

SIRA PLUS

Conține: Sulf (CAS: 7704-34-9)

ATENȚIE

H315 Provoacă iritarea pielii.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare.

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție /
protecție pentru ochi / protecție pentru față.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu apă din abundență

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase



COD UFI: D230-J0HS-W00M-VNN8

10L

Recomandări pentru utilizare

Cereale

Grâu, orz, ovăz, triticale, secară

Perioadă de aplicare: toamna din stadiul de 3 frunze (BBCH 13), primăvara după începutul vegetației;

Pentru culturile de primăvară, se aplică de la stadiul de 3 frunze (BBCH 13)

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 150-300 L

Rapiță

Perioada de aplicare: toamna, de la stadiul 4 până la 6 frunze (BBCH 14-16), primăvara după începutul vegetației.

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 150-300 L

Sfeklă de zahăr

Perioada de aplicare: când cultura acoperă cu frunze 10% din suprafața dintre rânduri (BBCH 31) până la sfârșitul perioadei de vegetație.

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 150-300 L

Cartof

Perioada de aplicare: de la stadiul de 3 frunze complet dezvoltate (BBCH 31) până la începutul îngălbenirii frunzelor (BBCH 91).

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 100-300 L

Porumb

Perioada de aplicare: de la a doua până la a opta frunză (BBCH 12-18).

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 150-300 L

Culturi pomicole

Măr, păr

Perioada de aplicare:

- primăvara, la începutul perioadei de vegetație (BBCH 00-07),
Doza: 3-5L/ha
- de la stadiul de mugur aproape activ până la stadiul de buton-roz (BBCH 09-55) și de la formarea fructelor (BBCH 73) până la 21 de zile înainte de recoltare.
Doza: 1-3L/ha
- după recoltare (BBCH 91-97)
Doza: 3-5L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 500-750 L

Piersic, cais, prun, cireș

Perioada de aplicare:

- primăvara, la începutul perioadei de vegetație (BBCH 00-10)
Doza: 3-5L/ha
- de la stadiul de mugure alb-roz până la înflorire (BBCH 10-57) și după formarea fructelor (50% din dimensiunea finală) (BBCH 73) până la 21 zile înainte de recoltare.
Doza: 1-3L/ha
- după recoltare (BBCH 91-97)
Doza: 3-5L/ha

Cantitatea recomandată de apă: 500-750 L

Afin, zmeur, căpșun

Perioada de aplicare:

- înainte de înflorire (BBCH 00-57) și de la începutul fazei de creștere a fructelor (BBCH 67-71)

Doza: 1-3L/ha

- După recoltare (BBCH 91-97)

Doza: 3-5L/ha

Cantitatea recomandată de apă: 400-600 L

Culturi legumicole

Castraveți, tomate, ardei

Primul tratament poate fi efectuat imediat ce legumele sunt plantate.

Momentul aplicării: se aplică în funcție de necesități, cu repetare, până la trei zile înainte de recoltare.

Doza: 1-3L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 800-1000 L/ha

Varză, conopidă:

Perioada de aplicare: Primul tratament poate fi efectuat după ce răsadurile au prins rădăcini. Repetați tratamentele după cum este necesar până cu trei zile înainte de recoltare.

Doza: 1-3 L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 500-700 L/ha.

Legume rădăcinoase:

Perioada de aplicare: Primul tratament poate fi efectuat după ce s-a dezvoltat a treia frunză și poate fi continuat, după caz, până la sfârșitul sezonului de vegetație.

Dozare: 1-3 L/ha

Cantitatea de apă recomandată: 500-700 L/ha

PFC 1(C)(I)(b)(i): Îngrășământ lichid simplu cu macronutrienți anorganici (S)(+52)

Conținutul declarat de nutrienți %(g/g)

52% sulf (S)

Ingrediente: Sulf (CAS: 7704-34-9)¹

¹CMC 1: substanțe și amestecuri din materiale virgine.

Îngrășământul SIRA PLUS este recomandat pentru utilizarea în culturile de câmp, livezi și culturile de legume, în special atunci când acestea sunt expuse la stres cauzat de condițiile de creștere nefavorabile. Combinația unică de sulf cu rășini naturale (terpenoide) îmbunătățește calitatea aplicării și crește eficiența tratamentului.

Instrucțiuni de utilizare

Utilizați numai atunci când este justificat. Nu depășiți doza. Luați în considerare condițiile meteorologice în timpul tratamentului. Contactați producătorul sau reprezentantul acestuia în România- Innvigo Agro SRL, pentru mai multe informații.

Notă:

- evitați aplicarea în condiții de temperaturi ridicate, cu expunerea culturii tratate la soare puternic;
- evitați pulverizarea pe vreme uscată, însorită și caldă și pe plantele care prezintă semne de ofilire,
- a nu se utiliza în timpul înfloririi.
- produsul este compatibil cu produse de protecție a plantelor, îngrășăminte foliare și biostimulatoare. A nu se combina cu tratamente microbiologice. În fiecare caz, se recomandă

efectuarea unui test de amestecare - mai întâi, trebuie dizolvat îngrășământul SIRA PLUS iar apoi se adaugă alte produse partenere.

- agitați recipientul înainte de utilizare.

Condiții de depozitare recomandate:

- evitați expunerea produsului la acțiunea directă a razelor de soare;
- evitați expunerea la umezeală
- condiții de depozitare : între +5°C și +25°C



PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII PROFESIONALE

PRODUCATOR:

PUH "Chemirol" sp. z o.o.

str. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

tel. +48 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

Importator/Distribuitor:

Innvigo Agro SRL

Cluj-Napoca, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, Nr 8-10,

Jud Cluj, Tel: 0374.912.123;

Email: office.ro@innvigo.com

www.ro.innvigo.com

Data expirării: 3 ani de la data fabricației

Data producției/numărul lotului: pe ambalaj

Forma: suspensie