

Fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă în combaterea bolilor foliare la măr

Conținut în substanță activă: 450 g/l pirimetanil

Formulare:

Concentrat pentru pregătirea unei emulsii apoase (SC)

Proprietăți fizico-chimice: Batalion 450 EC se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, de culoare galbenă, cu miros caracteristic.

Mod de acțiune: Batalion 450 SC este un fungicid de contact al cărui mecanism de acțiune constă în inhibarea capacității ciupercii în producerea enzimelor care determină declanșarea procesului de infecție. Acțiunea produsului Batalion 450 SC este de contact, preventivă și translaminară iar distribuția produsului este în interiorul frunzelor.



Mod de utilizare: Pentru combaterea bolilor la măr (menționate în tabelul cu omologări) se recomandă aplicarea fungicidului Batalion 450 SC, preventiv sau curativ, de la fenofaza de boboci florali vizibili, verzi, stadiu în care floarea este închisă și complet acoperită de sepale (BBCH – 55), până la "prima scuturare a fructelor" după înflorire, fructele având dimesiunea de peste 1 cm (BBCH – 71).

În România produsul este omologat la următoarele doze și culturi:

CULTURA	AGENTUL DE DĂUNARE	DOZA (L/ha)
Măr	Venturia inaequalis (rapănul)	0.7-1 l/ha (Buton verde- Sfârșitul înfloritului, BBCH 56-69)
	Podosphaera leucotricha (făinarea)	0.7-1 l/ha (Apariția mugurilor florali - Fructe de 10 mm, BBCH 55-71)

Volumul de apă recomandat: 750 l/ha.

Număr maxim de tratamente pe an: 3

Intervalul între tratamente: În cazul rapănului minim 10 zile, iar în cazul făinării minim 7 zile.

Recomandări: Preventiv, fungicidul Batalion 450 SC se aplică la fiecare 7-10 zile în funcție de condițiile meteorologice iar cu scop de intervenție tratamentul se execută cu până la 72 de ore după infectare. Batalion 450 SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor. Nu se recomandă amestecul cu substanțe puternic alcaline sau produse ce conțin aluminiu.