

**Erbicid sistemic, selectiv, pentru combaterea în postemergență a buruienilor monocotiledonate anuale din culturile de cereale**

**Conținut în substanță activă:** 110g/l fenoxaprop-P-etil

**Formulare:** Emulsie concentrată (EC)


**Proprietăți fizico-chimice:** Herbos 110 EC fenoxaprop-etil se prezintă sub formă de concentrat emulsionabil, de culoare galben-roz, cu miros caracteristic.

**Mod de acțiune:** Herbos 110 EC este un erbicid selectiv aplicat foliar postemergent cu acțiune sistemică, este rapid absorbit de frunze și translocat în vârfurile de creștere a lăstarilor și rădăcinilor. După 2-3 zile de la tratament, creșterea buruienilor este inhibată. Acțiunea produsului este vizibilă după 2-4 săptămâni de la aplicare, în funcție de condițiile meteorologice. HERBOS 110 EC distruge cel mai eficient buruienile monocotiledonate de la stadiul de două frunze până la sfârșitul fazei de înfrățire. Iarba vântului este combătută în faza de 2 - 8 frunze.

**Mod de utilizare:** Herbos 110 EC se aplică în postemergență pentru controlul buruienilor monocotiledonate anuale la culturile de grâu, triticale, orz de toamnă și grâu și orz de primăvară. Se recomandă aplicarea produsului când plantele de cultură sunt în primele stadii de dezvoltare, înainte de acoperirea completă a rândurilor.

**Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:**

CULTURA	AGENTUL DE DĂUNARE	DOZA (L/Ha)
Grâu, orz triticale de primăvară și toamnă	Burieni sensibile: Monocotiledonate anuale și perene	0,7 l/ha De la începutul înfrățirii până la începutul împălerii (BBCH 20-31)



**Volumul de apă:** 200 - 300 l/ha

**Numărul maxim de tratamente pe an:** 1

**Recomandări:** La o singură aplicare a produsului Herbos în culturile de grâu, orz și triticale de primăvară sunt controlate următoarele buruieni monocotiledonate: Echinochloa Crus-galli (iarbă bărboasă), Avenua fatua (odos/ ovăz sălbatic).

În culturile de cereale păioase de toamnă, produsul controlează buruienile monocotiledonate:

**Buruieni sensibile:** Alopecurus Mysoydes (coada vulpii)

**Buruieni mediu sensibile:** Apera spica-venti (iarba vântului)

Pentru controlul buruienilor dicotiledonate anuale și perene, produsul Herbos 110 C se poate aplica în amestec cu: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG și Galaper 200 EC/Herbistar 200 EC

**Doza maximă recomandată a amestecului pentru o singură aplicare:**

Herbos 110 EC - 0,5 l/ha + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG - 25 g/ha  
sau Herbos 110 EC + Galaper 200 EC/Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.

**Spectrul de combatere în amestec este:**

**Pentru grâu, orz și triticale de toamnă:**

**Buruieni sensibile:** Geranium pusillum (buchet), Stellaria media (rocoină), Lamium amplexicaule (sugel), Matricaria inodora (mușețel nemirositor), Papaver rhoeas (mac de câmp), Mysoides arvensis (miozotis / ochii păsăruicii), Galium aparine (lipicioasă), Capsella bursa-pastoris (trais-ta-ciobanului), Alopecurus mysoydes (coada vulpii).

**Buruieni mediu sensibile:** Centaurea cyanus (albăstrea), Viola arvensis (trei frați pătați), Lamium purpureum (sugel puturos), Veronica persica (ventrilica), Apera spica-venti (iarba-vântului), Veronica arvensis (veronica).

**Pentru grâu, orz și triticale de primăvară:**

**Buruieni sensibile:** Centaurea cyanus (albăstrea), Echinochloa crus-galli (iarbă-bărboasă), Stellaria media (rocoină), Lamium amplexicaule (sugel), Chenopodium album (spanac sălbatic), Matricaria inodora (mușețel nemirositor), Avena fatua (odos / ovăz sălbatic), Galium aparine (lipicioasă), Fallopia convolvulus (hrișcă urcătoare), Polygonum lapathifolium (iarba roșie), Galinsoga parviflora (busuiocul dracului).

**Buruieni mediu sensibile:** Trei frați pătați (viola arvensis), Ventrilica (veronica persica)