

ADIUNKT 500 SC

Erbicid post emergent pentru controlul buruienilor dicotiledonate și unele monocotiledonate din culturile de grâu de toamnă și triticale de toamnă

Conținut în substanță activă : 500g/l diflufenican

Formulare: Suspensie concentrată

Proprietăți fizico - chimice:

Adiunkt 500 SC este un erbicid formulat ca suspensie concentrată, pentru aplicare foliară, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și unele monocotiledonate din culturile de grâu de toamnă și triticale de toamnă.

Mod de acțiune :

Adiunkt 500 SC este preluat în special prin frunze și parțial prin rădăcinile buruienilor. Acțiunea produsului este favorizată de umiditatea optimă a solului. Efectul erbicid optim este obținut prin utilizarea produsului în stadiile timpurii de dezvoltare a buruienilor, adică în timpul germinării sau la scurt timp după răsărire.

Mod de utilizare :

Adiunkt 500 SC se aplica pe vegetație în culturile de cereale de toamnă.

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos :

CULTURA	AGENTUL DE DAUNARE	DOZA(l/kg/ha)
Grâu de toamnă Triticale de toamnă	Buruieni sensibile: trei frați pătați (<i>Viola arvensis</i>), răcovină (<i>Stellaria media</i>), sugel (<i>Lamium amplexicaule</i>), nu-mă-uita (<i>Myosotis arvensis</i>), doritoare (<i>Veronica hederifolia</i>), ventrilica (<i>Veronica persica</i>), măzăriche (<i>Vicia cracca</i>) Buruieni mediu sensibile: mușețel nemiroitor (<i>Matricaria indora</i>), lipicioasă (<i>Galium aparine</i>) Buruieni cu rezistență medie: albăstrea (<i>Centaurea cyanus</i>), iarba vântului (<i>Apera spica-venti</i>) Buruieni rezistente: mac de câmp (<i>Papaver rhoeas</i>)	0,24 l/ha (BBCH 14-23).
Grâu de toamnă Triticale de toamnă	Buruieni sensibile: trei frați pătați (<i>Viola arvensis</i>), răcovină (<i>Stellaria media</i>), (<i>Lamium amplexicaule</i>), nu-mă-uita (<i>Myosotis arvensis</i>), doritoare (<i>Veronica hederifolia</i>), (<i>Veronica persica</i>), măzăriche (<i>Vicia cracca</i>) Buruieni mediu sensibile: mușețel nemiroitor (<i>Matricaria indora</i>), iarba vântului (<i>Apera spica-venti</i>), lipicioasă (<i>Galium aparine</i>) Buruieni cu rezistență medie: albăstrea (<i>Centaurea cyanus</i>)	0,3 l/ha (BBCH 14-23).

Volum de apă : 200-300l/ha

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1

Grâu de toamnă, triticale de toamnă

Doza maximă pentru o singură administrare: 0,3 l/ha

Doza recomandată pentru o singură administrare: 0,24-0,3 l/ha

Tratamentul trebuie efectuat în faza de 4 frunze a culturii până la sfârșitul sezonului de creștere de toamnă, dar nu mai târziu de sfârșitul fazei de 3 frați vizibili (BBCH 14-23).

Cantitatea recomandată de apă : **200-300 l/ha**

Tehnica de stropire recomandată : **picături medii**

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1

Atenție:

O doză mai mare decât cea recomandată trebuie aplicată atunci când buruienile sunt în faze de dezvoltare avansată, și pentru a combate iarba vântului și lipicioasa.