

MAJOR 300 SL

Erbicid post emergent pentru combaterea buruienilor cu frunza lată din culturile de rapiță de toamnă, grâu de toamnă și sfeclă de zahăr

Conținut în substanță activă: 300 g/l clopiralid

Formulare: concentrat solubil

Proprietăți fizico-chimice Erbicid post emergent sub formă de concentrat lichid pentru obținerea unei soluții apoase aplicată foliar.

Mod de acțiune : Produsul este preluat de frunzele buruienilor. Substanța activă a produsului inhibă acțiunea hormonilor naturali ai plantelor responsabili de creșterea plantelor. Produsul interferează cu multe procese care au loc în plante, inclusiv procesele de diviziune celulară, sinteza proteinelor și a acidului nucleic și procesul de respirație la nivel celular. Combate cel mai eficient buruienile tinere, în fenofaza de creștere intensă, de la faza a 2-3 frunze până la faza de rozetă.

Mod de utilizare :

Major 300 SL se aplica post-emergent pentru culturile:

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos :

CULTURA	AGENTUL DE DAUNARE	DOZA(l/kg/ha)
Rapiță de toamnă Rapiță de primăvară	Albăstrea (<i>Centaurea cyanus</i>), mușețel nemirositor (<i>Matricaria inodora</i>), pălămidă (<i>Cirsium arvensis</i>), romanița de câmp (<i>Anthemis arvensis</i>), mușețel (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Major 300 SL 0,3 l/ha+ Metax 500 SC 1,5 l/ha (BBCH 13-14) Major 300 SL 0,3-0,4 l/ha (BBCH 50)
Grâu de toamnă	Mușețel nemirositor (<i>Matricaria inodora</i>), zârnă (<i>Solanum nigrum</i>), romaniță de câmp (<i>Anthemis arvensis</i>), busuiocul dracului (<i>Galinsoga parviflora</i>), pălămidă (<i>Cirsium arvense</i>), mușețel (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Major 300 SL 0,3-0,4 l/ha (BBCH 20-29).
Sfeclă de zahăr	Albăstrea (<i>Centaurea cyanus</i>), mușețel nemirositor (<i>Matricaria inodora</i>), pălămidă (<i>Cirsium arvensis</i>), romanița de câmp (<i>Anthemis arvensis</i>), mușețel (<i>Matricaria chamomilla</i>), busuiocul dracului (<i>Galinsoga parviflora</i>), hrișcă urcătoare (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Major 300 SL 0,3-0,4 l/ha (BBCH 12-14). sau 3 aplicari x 0,2l/ha (BBCH 12-14).

ATENȚIE:

Temperaturile negative sau scăzute care apar la câteva zile după tratamentul culturii pot determina efecte fitotoxice tranzitorii care nu au niciun efect asupra producției.

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație:

Rapiță număr maxim de tratamente **1**

Doza maximă pentru o singură administrare: 0,4 l/ha

Doza recomandată pentru o singură administrare: 0,3-0,4 l/ha

Grâu de toamnă

Doza maximă pentru o singură administrare: 0,4 l/ha

Doza recomandată pentru o singură administrare: 0,3-0,4 l/ha

Sfecla de zahăr numar maxim de tratamente 3

1.Doza maximă pentru o singură administrare: 0,4 l/ha

Doza recomandată pentru o singură administrare: 0,3-0,4 l/ha

2.Produsul poate fi de asemenea utilizat într-o succesiune de trei tratamente:

Doza maximă / recomandată pentru 3 administrări:

-primul tratament 0,2 l/ha, al doilea tratament 0,2 l/ha, al treilea tratament 0,2 l/ha, cu intervalul dintre tratamente: 6 - 10 zile.

Volum de apa : 200-300l/ha